

## Ampliación del rango altitudinal del mosquerito pechirrayado *Myiophobus fasciatus* (Muller, 1776) en Sierpe, Osa Costa Rica

[*Altitudinal range extension of the bran-colored flycatcher *Myiophobus fasciatus* (Muller, 1776) in Sierpe, Osa Costa Rica*]

Raby Nuñez-Escalante<sup>1</sup>, Ghisselle Alvarado-Quesada<sup>2</sup>, Carlos Molina-Gutiérrez<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Guía Naturalista, Sierpe, Correo electrónico: [ranus2006@hotmail.com](mailto:ranus2006@hotmail.com)

<sup>2</sup>Museo Nacional de Costa Rica, Departamento de Historia Natural

<sup>3</sup>Guía Naturalista, Sierpe, Correo electrónico: [sierpeparadise@gmail.com](mailto:sierpeparadise@gmail.com)

Recibido: 11 mayo 2018

Aceptado: 24 mayo 2018

El mosquerito pechirrayado (*Myiophobus fasciatus*) es una especie de la familia Tyrannidae, que se distribuye desde Costa Rica hasta Brasil, norte de Chile y parte media de Argentina (Stiles y Skutch 1989). Asimismo, en Costa Rica se conoce que se le encuentra en el Pacífico Sur en altitudes medias entre 700 a 1200 msnm (Stiles y Skutch 1989, Garrigues 2014). Existe un reporte de la existencia del ave en las cercanías de Golfito, Pacífico Sur, pero ni la localidad o la altitud han sido especificadas.

El 3 de mayo del 2018, se observó un individuo del mosquerito pechirrayado a una altitud de 7 msnm, en la localidad conocida como Villas de Sierpe, Osa, Puntarenas, 8052'00,48 N, 830 28'18,05 W, 4:57 pm (Fig.1). El ave estaba alimentándose de insectos, usando como percha



**Figura 1.** Mosquerito pechirrayado *Myiophobus fasciatus*, Sierpe, Costa Rica.



**Figura 2.** Hábitat del mosquerito pechirrayado *Myiophobus fasciatus*, Sierpe, Costa Rica.

un árbol de guayaba (*Psidium guajava*). Cuatro días después se visitó la localidad y el ave todavía continuaba allí, solo que en un árbol de nance (*Brysonima crassifolia*) a la par del de guayaba y se encontraba perchedo. El hábitat donde se observó, son lotes para urbanización con poco mantenimiento que asemejan más un potrero (Fig. 2). La especie nunca antes había sido observada en esta localidad y menos a esta altitud tan baja, casi cerca del nivel del mar. Por lo que es el objeto de esta comunicación aumentar el conocimiento de la distribución

altitudinal de la especie. En Panamá, esta especie se ha observado en las inmediaciones del Canal de Panamá, es decir a altitudes sobre el nivel del mar tan bajas como la observación que se reporta en esta comunicación (Ridgely y Gwynne 1993), sin embargo, no es común (Ridgely y Gwynne 2005). Según estos autores, las descripciones de hábitat son similares (Ridgely y Gwynne 1993, 2005).

### Agradecimientos

Al Museo Nacional de Costa Rica por el tiempo dado para escribir la comunicación.

### Referencias

- Garrigues, R. 2007. *The Birds of Costa Rica. A Field Guide*. Ilus. R. Dean. Ithaca, Nueva York: Zona Tropical.
- Ridgely, R. y J. Gwynne. 1993. *Aves de Panamá, incluyendo Costa Rica, Nicaragua y Honduras*, primera edición. Ciudad de Panamá: Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON).
- Ridgely, R. y J. Gwynne, Jr. 2005. *Aves de Panamá, incluyendo Costa Rica, Nicaragua y Honduras*, segunda impresión. Ciudad de Panamá: Sociedad Audubon de Panamá y Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON).
- Stiles, F. G. y A. F. Skutch. 1989. *A Guide to the Birds of Costa Rica*. Ilus. D. Gardner. Nueva York: Cornell University Press.